



LIFE Global: actuaciones en la ZEPA de A Limia

LIFE Connect Ricotí Final Congress


Serafín González Prieto

Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC)





LIFE Global: 27 ZECs + 1 ZEPA

01-06-2024 a 30-09-2029



- IBA ES008 A Limia: 32.648 ha
- Sentencia TJCE 28-06-2007
- Decreto XG 411/2009:
 - 6.939 ha
 - *Tetrax tetrax*
 - *Burhinus oedicephalus*
 - *Circus pygargus*
 - *Calandrella brachydactyla*





“Veiga de Gomareite”

Antigua Laguna de Antela



“Veiga” de Gomareite

Valores ambientales

*3170 Estanques temporales mediterráneos



~1/4 población mundial *Eryngium viviparum*



“Veiga” de Gomareite

Valores ambientales

Buena población *Pelobates cultripes*



~1/3 parejas gallegas *Vanellus vanellus*



“Veiga” de Gomareite

Valores ambientais



Burhinus oedicephalus





Tetrax tetrax





Burhinus oedicnemus en España



Burhinus oedicnemus en ZEPA de A Limia



Tetrax tetrax en España



Tetrax tetrax en ZEPA de A Limia

Figura 114.- Vernáculos de *Tetrax tetrax*




Figura 115

Distribución de *Tetrax tetrax*

Período 1930-1960

n Referencia de cría posible/probable

N Referencia de cría confirmada

P Referencia de presenza de migrantes

Período 1975-1993

○ Cría posible

○ Cría probable


Período 1994-2013

● Cría posible

● Cría probable

○ Cría actual posible, probable en 1975-93


■ Presenza de migrantes



LIFE Global en “Veiga” de Gomareite

Work package 5

- Monte vecinal en mano común (propiedad privada-colectiva):
 - Acuerdo CSIC-MVMC (18-03-2025)
 - Pago único compensatorio
 - Derechos de uso durante 30 años
 - Conservación de 30 ha



LIFE Global en “Veiga” de Gomareite

Work package 13

- Manejo de 20 ha de vegetación natural mediante pastoreo de vacuno en extensivo.
- Siembra de 10,5 ha con leguminosas de elevado interés para **Tetrax tetrax*.
- Pastor eléctrico: cierre permeable y no lesivo para la fauna silvestre.
- Control de la vegetación arbustiva en 3 ha.
- Regulación del nivel del agua en 1,7 ha para asegurar la disponibilidad de bebederos para **Tetrax tetrax* y la ganadería extensiva.



Siembra de leguminosas

Selección especies autóctonas

- Suelos ácidos → ~~*Medicago sativa*~~
- Encharcamiento invernal
- Sequía estival
 - *Ornithopus sativus*: 10 kg/ha
 - *Trifolium subterraneum*: 10 kg/ha
 - *Lotus corniculatus*: 2,5 kg/ha

Faria et al., 2012. Linking plant composition and arthropod abundance to establish little bustard breeding requirements in pastureland dominated landscapes. *Biodiversity and Conservation* 21, 2109-2125.

18-11-2025



Siembra de leguminosas

Año de meteorología adversa

- Siembra retrasada por la sequía
- Intensas precipitaciones en invierno

07-02-2026



Siembra de leguminosas

Nascencia heterogénea

- Influencia de la microtopografía:
nascencia baja en zonas inundables
- Variable entre especies, siendo nula (?) en *Lotus corniculatus*

19-02-2026



Siembra de leguminosas

Trifolium subterraneum

- Nascencia:
 - Globalmente baja
 - (Muy) buena en zonas más húmedas
- Dominado por *Ornithopus* en zonas menos húmedas

27-05-2026



Siembra de leguminosas

Ornithopus sativus

- Nascencia:
 - Baja en zonas inundables
 - (Muy) buena en zonas menos húmedas
- Especie con mayor cobertura

27-05-2026



Seguimiento en 2026

- No se ha detectado presencia de sisón o alcaraván.
- Área con leguminosas muy utilizada por el núcleo reproductor de avefría.
- Pendiente de evaluación los efectos sobre la densidad de artrópodos.





**Muchas gracias
por la atención**

